

42N215_JALSG APL220 寛解導入

ATO(Day1-7) + ATRA(Day1-7)
 (高リスク)2クール目、(低・中リスク)1クール目より開始
 最低28日、最大60日まで投与

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 15min		●	●	●	●	●	●	●
2	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●	●	●	●	●
3	ブドウ糖液注5%(250mL) トリセノックス点滴静注	1 袋 _____mg[0.15mg/kg]	div / 2hr		○	○	○	○	○	○	○
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●	●	●	●	●
5	ベサノイドCap	_____mg[45mg/m ²]	po / 分2 朝夕食後		●	●	●	●	●	●	●
6	ブレドニゾロン錠	_____mg[0.5mg/kg]	po		●	Day1-14まで投与し、 その後、1週間かけて漸減して終了					