

05G007\_CBDCA(1) + PTX200mg/m<sup>2</sup>(1) 3週毎CBDCA(Day1) + PTX 200mg/m<sup>2</sup> (Day1) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆アルコールに対する過敏症はありませんか？ → ( 有 ・ 無 )

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg ポララミン注5mg ファモチジン注射液20mg	1 瓶 10 A 1 A 1 A	div / 15min		●						
2	グラニセトン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 瓶	div / 30min		●						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4	テルモ生食(500mL) パクリタキセル注	1 袋 _____mg[200mg/m <sup>2</sup> ]	div / 3hr		○						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6	ブドウ糖注5%(250mL) カルボブラチン注	1 袋 _____mg[AUC 6 ]	div / 1hr		○						
7	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。