

05N032_(維持)Atezo+Bev_3週毎

Atezolizumab(Day1) + Bevacizumab(Day1) 3週毎 PDまで

- ◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)
- ◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。
- ◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
2	生食注(250mL) テセントリク点滴静注	1 袋 1200mg[1200mg/body]	div / ※1 1hr		○						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
4	生食注(100mL) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____mg[15mg/kg]	div / ※2 1.5hr		○						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※1 テセントリク注は、初回の忍容性が良好ならば2回目以降は30分で投与可。

※2 ベバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

・ テセントリク注の輸液は、生食250mL限定

・ テセントリク注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2～0.22 μ m)を使用すること。