

05N033_Durva(1)+CBDCA(1)+VP-16(1・2・3)_3週毎

Durvalumab(Day1) + CBDCA(Day1) + VP-16(Day1・2・3) 3週毎 4コース

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
2	生食注(250mL) イミフィンジ点滴静注	1 袋 _____mg[※1500mg/body]	div / 1hr		○						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4	グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 3 A	div / 30min		●						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 3 A	div / 15min			●	●				
7	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg[AUC 5]	div / 1hr		○						
8	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
9	テルモ生食(500mL) ベブシド注	1 袋 _____mg[100mg/m2]	div / 1.5hr		○	○	○				
10	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				

※ イミフィンジ注は体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする。

- ・ イミフィンジ注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用すること。
- ・ イミフィンジ注の希釈後の濃度は、1～15mg/mLとなること。