

05N038_肺 Ipi(1)+Nivo(1・29)_6週毎

Ipilimumab(Day1) + Nivolumab(Day1・22) 6週毎

- ◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)
- ◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。
- ◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
						● Day 22					
2	生食注(100mL) オブジーボ点滴静注	1 瓶 360mg[360mg/body]	div / 30min		○						
						○ Day 22					
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / 30min		●						
4	生食注(50mL) ヤーボイ点滴静注液	1 瓶 _____mg[1mg/kg]	div / 30min		○						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
						● Day 22					

- ・ オブジーボ注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 μ m)を使用すること。
- ・ ヤーボイ注の投与にあたっては、0.2~1.2ミクロンのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。