

05N041_Durva(1)+Treme(1)+CBDCA(1)+nab-PTX(1.8.15)_3週毎

Durvalumab(Day1) + Tremelimumab(Day1) + CBDCA(Day1) + nabPTX(Day1・8・15) 3週毎 4コース

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
2	生食注(100mL) イジユド点滴静注	1 瓶 75mg[75mg/body]	div(メイン) / 1hr		○						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
4	生食注(250mL) イミフィンジ点滴静注	1 袋 _____mg [1500mg/body]※1	div(メイン) / 1hr		○						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
6	グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 3 A	div(メイン) / 30min		●						
7	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
8	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div(メイン) / 15min						● Day 8 / Day 15		
9	生食注(50mL)	1 瓶	div(側管※3) / フラッシュ		●				● Day 8 / Day 15 ※3 Day8,15はメインルートを使用		
10	生食注 アブラキサン点滴静注	※2 _____mg[100mg/m ²]	div(側管※3) / 30min		○				○ Day 8 / Day 15 ※3 Day8,15はメインルートを使用		
11	生食注(50mL)	1 瓶	div(側管※3) / フラッシュ		●				● Day 8 / Day 15 ※3 Day8,15はメインルートを使用		
12	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg[AUC 5-6]	div(メイン) / 1hr		○						
13	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						

※1 イミフィンジ注は体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする。

※2 アブラキサン注投与量が1~200mgの場合は生食50mL、201mg以上の場合は生食100mLを用いる。

- ・ イジユド注およびイミフィンジ注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用すること。
- ・ イジユド注の希釈後の濃度は、0.1~10mg/mLとなること。
- ・ イミフィンジ注の希釈後の濃度は、1~15mg/mLとなること。
- ・ アブラキサン注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用しないこと。
- ・ 特定生物由来製品(アブラキサン)説明書を発行して、患者へ説明すること。