

05N046_(維持)肺_Durva+PEM_4週毎

Durvalumab(Day1) + Pemetrexed(Day1) 4週毎

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施・入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	シアノコバラミン注1000 μ g	1 A	im			●					
2	調剤用バンビタン末	1 g	po / 分1			●					
3	デカドロン錠0.5mg	16 錠	po			●					
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5	生食注(250mL) イミフィンジ点滴静注	1 袋 _____mg[※1500mg/body]	div / 1hr		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7	生食注 ペメトレキセド点滴静注液	※ _____mg[500mg/m ²] (全量100mLとする。)	div / 10min		○						
8	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※ イミフィンジ注は体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする。

- ・ イミフィンジ注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用すること。
- ・ イミフィンジ注の希釈後の濃度は、1~15mg/mLになること。
- ・ NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day-1~3)
- ・ 大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。