

05N058_Ipi(1)+Nivo(1・22)+CBDCA(1・22)+PTX(1・22)_6週毎

Ipilimumab(Day1) + Nivolumab(Day1・22) + CBDCA(Day1・22) + PTX(Day1・22) 6週毎 1コース

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

◆ アルコールに対する過敏症はありませんか？ → (有 ・ 無)

| Rp | 商品名 | 用量[基準量] | 投与方法 | Day0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---------------------------------------|-------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食注(50mL) | 1 瓶 | div / 15min | | ● | | | | | | |
| | | | | | | ● Day 22 | | | | | |
| 2 | 生食注(100mL) オブジーボ点滴静注 | 1 瓶 360mg[360mg/body] | div / 30min | | ○ | | | | | | |
| | | | | | | ○ Day 22 | | | | | |
| 3 | 生食注(50mL) | 1 瓶 | div / 30min | | ● | | | | | | |
| | | | | | | ● Day 22 | | | | | |
| 4 | 生食注(50mL) ヤーボイ点滴静注液 | 1 瓶 _____mg[1mg/kg] | div / 30min | | ○ | | | | | | |
| 5 | 生食注(50mL) | 1 瓶 | div / 15min | | ● | | | | | | |
| 6 | 生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg ポララミン注5mg ファモチジン注射液20mg | 1 瓶 10 A 1 A 1 A | div / 15min | | ● | | | | | | |
| | | | | | | ● Day 22 | | | | | |
| 7 | グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg | 1 袋 1 瓶 | div / 30min | | ● | | | | | | |
| | | | | | | ● Day 22 | | | | | |
| 8 | 生食注(50mL) | 1 瓶 | div / フラッシュ | | ● | | | | | | |
| | | | | | | ● Day 22 | | | | | |
| 9 | テルモ生食(500mL) パクリタキセル注 | 1 袋 _____mg[200mg/m ²] | div / 3hr | | ○ | | | | | | |
| | | | | | | ○ Day 22 | | | | | |
| 10 | 生食注(50mL) | 1 瓶 | div / フラッシュ | | ● | | | | | | |
| | | | | | | ● Day 22 | | | | | |
| 11 | ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注 | 1 袋 _____mg[AUC 6] | div / 1hr | | ○ | | | | | | |
| | | | | | | ○ Day 22 | | | | | |
| 12 | 生食注(50mL) | 1 瓶 | div / フラッシュ | | ● | | | | | | |
| | | | | | | ● Day 22 | | | | | |

- ・ パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。
- ・ オブジーボ注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 μ m)を使用すること。
- ・ ヤーボイ注の投与にあたっては、0.2~1.2ミクロンのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。