

05N060_(1クール目)_Amivantamab+Lazertinib_4週毎

Amivantamab(Day1・2・8・15・22) + Lazertinib(Day1-28) 4週毎 1コース

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 6 A	div / 15min		●	●					
2	アセリオ 静注液1000mg ポララミン注5mg	1 袋 1 A	div / 15min		●	●					
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / 30min		●	●					
4	生食注(250mL) ライブリバント点滴静注	1 袋 _____mg[350mg/body] (全量250mLとする。)	div / ※別表に従う		○						
5	生食注(250mL) ライブリバント点滴静注	1 袋 _____mg[700mg/body] ^{※1} (全量250mLとする。) ※1 体重80kg以上の場合 1050mg/body	div / ※別表に従う			○					
6	生食注(250mL) ライブリバント点滴静注	1 袋 _____mg[1050mg/body] ^{※2} (全量250mLとする。) ※2 体重80kg以上の場合 1400mg/body	div / ※別表に従う								○ Day 8 / Day 15 / Day 22
7	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●					● Day 8 / Day 15 / Day 22
8	ラズクルーズ錠	240mg[240mg/日]	po								● Day 1 - Day28 (連日)

- ライブリバントは、ポリエーテルスルホン製、ナイロン製又はポリスルホン製のインラインフィルター(孔径0.2 μ m又は0.22 μ m)を備えたポリウレタン、ポリブタジエン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン又はポリエチレン製を用いること。
- ラゼルチニブとの併用投与による静脈血栓塞栓症の発症を抑制するため、当該併用投与開始後4ヵ月間は、アピキサバン1回2.5mgを1日2回経口投与すること。
- 皮膚障害対策として、あらかじめ”RASH対応セット”をオーダーしてください。