

05N010_(維持)Bev+PEM_3週毎

Bevacizumab(Day1) + Pemetrexed(Day1) 3週毎

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	シアノコバラミン注1000 μ g	1 A	im								
						●					
2	調剤用バンビタン末	1 g	po / 分1								
										●	
3	デカドロン錠4mg	2 錠	po								
											●
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5	生食注 ペメトレキセド点滴静注液	※ _____mg[500mg/m ²] (全量100mLとする。)	div / 10min		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7	生食注(100mL) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____mg[15mg/kg]	div / ※ 1.5hr		○						
8	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※ ベバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

- ・ NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day -1~3)
- ・ 大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。