

## 05N013\_Short CDDP(1) + VP-16(1・2・3) 3週毎

CDDP(Day1) + VP-16(Day1・2・3) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	デカドロン錠4mg	2 錠	po			●	●	●			
2	パロセトン注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 6 A	div / 30min		●						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
4	テルモ生食(500mL) ベプシド注	1 袋 _____mg[100mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1.5hr		○	○	○				
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
6	YDソリター-T1号(500mL) アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 キット 8 mEq	div / 1hr		●						
7	20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
8	生食注(250mL) シスプラチン注	1 袋 _____mg[80mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
9	ソルデム3A(500mL)	1 袋	div / 1hr		●						

- ・ ベプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。
- ・ Day1～3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・ 脱水、食思不振時は追加補液。