

## 05N015\_Short CDDP(1) + GEM(1・8) 3週毎

CDDP(Day1) + GEM(Day1・8) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	デカドロン錠4mg	2 錠	po			●	●	●			
2	パロセトン注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 6 A	div / 30min		●						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div / 15min								
5	生食注(100mL) ゲムシタピン注	1 瓶 _____mg[1000mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7	YDソリター-T1号(500mL) アスパラギン酸カルウム注10mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 キット 8 mEq	div / 1hr		●						
8	20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
9	生食注(250mL) シスプラチン注	1 袋 _____mg[80mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
10	ソルデム3A(500mL)	1 袋	div / 1hr		●						
11	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ								● Day 8

- ・ Day1～3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・ 脱水、食思不振時は追加補液。