

## 05N017\_ShortCDDP+PEM\_3週毎

CDDP(Day1) + Pemetrexed(Day1) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	シアノコバラミン注1000 $\mu$ g	1 A	im								
						●					
2	調剤用バンビタン末	1 g	po / 分1								
										●	
3	デカドロン錠4mg	2 錠	po								
											●
4	パロセトロン注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 瓶	div / 30min		●						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6	生食注 ペメトレキセド点滴静注液	※ _____mg[500mg/m <sup>2</sup> ] (全量100mLとする。)	div / 10min		○						
7	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
8	YDソリター-T1号(500mL) アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 キット 8 mEq	div / 1hr		●						
9	20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
10	生食注(250mL) シスプラチン注	1 袋 _____mg[75mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
11	ソルデム3A(500mL)	1 袋	div / 1hr		●						

- ・ NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day-1~3)
- ・ 大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。
- ・ Day1~3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・ 脱水、食思不振時は追加補液。