

## 05N044\_肺\_Durva+Treme+CBDCA+PEM\_3週毎

Durvalumab(Day1) + Tremelimumab(Day1) + CBDCA(Day1) + Pemetrexed(Day1) 3週毎 4コース

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	シアノコバラミン注1000 $\mu$ g	1 A	im								
						●					
2	調剤用バンピタン末	1 g	po / 分1								
										●	
3	デカドロン錠4mg	2 錠	po								
										●	
4	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
5	生食注(100mL) イジユド点滴静注	1 瓶 75mg[75mg/body]	div(メイン) / 1hr		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
7	生食注(250mL) イミフィンジ点滴静注	1 袋 _____mg[※1500mg/body]	div(メイン) / 1hr		○						
8	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
9	グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 瓶	div(メイン) / 30min		●						
10	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
11	生食注 ペメトレキセド点滴静注液	※ _____mg[500mg/m <sup>2</sup> ] (全量100mLとする。)	div(メイン) / 10min		○						
12	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						
13	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg[AUC 5-6 ]	div(メイン) / 1hr		○						
14	生食注(50mL)	1 瓶	div(メイン) / フラッシュ		●						

※ イミフィンジ注は体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする。

- ・ イジユド注およびイミフィンジ注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用すること。
- ・ イジユド注の希釈後の濃度は、0.1~10mg/mLとなること。
- ・ イミフィンジ注の希釈後の濃度は、1~15mg/mLとなること。
- ・ NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day-1~3)
- ・ 大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。