

05N059_Ipi(1)+Nivo(1・22)+CBDCA(1・22)+PEM(1・22)_6週毎

Ipilimumab(Day1) + Nivolumab(Day1・22) + CBDCA(Day1・22) + Pemetrexed(Day1・22) 6週毎 1コース

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	シアノコバラミン注1000 μ g	1 A	im			●					
2	調剤用バンピタン末	1 g	po / 分1			●					
3	デカドロン錠4mg	2 錠	po			●					
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
5	生食注(100mL) オブジーボ点滴静注	1 瓶 360mg[360mg/body]	div / 30min		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / 30min		●						
7	生食注(50mL) ヤーボイ点滴静注液	1 瓶 _____mg[1mg/kg]	div / 30min		○						
8	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
9	グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 瓶	div / 30min		●						
10	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
11	生食注 ペメトレキセド点滴静注液	※ _____mg[500mg/m ²] (全量100mLとする。)	div / 10min		○						
12	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
13	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg[AUC 5]	div / 1hr		○						
14	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

- ・ NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day -1~3)
- ・ 大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。
- ・ オブジーボ注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 μ m)を使用すること。
- ・ ヤーボイ注の投与にあたっては、0.2~1.2ミクロンのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。