

10N026_NEC_Short CDDP(1) + CPT-11(1・8・15) 4週毎

CDDP(Day1) + CPT-11(Day1・8・15) 4週毎

◆ ____月 ____日(Day1)から ____コース実施。(外来で実施・入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	デカドロン錠4mg	2 錠	po			●	●	●			
● Day 9-10 / Day 16-17											
2	パロセトン注バッグ0.75mg/50mL デカドロン注射液1.65mg アロカリス点滴静注235mg	1 袋 6 A 1 瓶	div / 30min		●						
3	グラニセトン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min								
● Day 8 / Day 15											
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5	テルモ生食(500mL) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____mg[60mg/m ²]	div / 1.5hr		○						
○ Day 8 / Day 15											
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7	YDソリター-T1号(500mL) アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 キット 8 mEq	div / 1hr		●						
8	20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
9	生食注(250mL) シスプラチン注	1 袋 _____mg[60mg/m ²]	div / 1hr		○						
10	ソルデム3A輸液(500mL)	1 袋	div / 1hr		●						
11	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ								
● Day 8 / Day 15											

- ・ Day1~3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・ 脱水、食思不振時は追加補液。