

## 42N125\_(5コース目以降)\_IsaVRd

5-17コース :Isatuximab(Day1・15) + Dexamethasone(Day1・8・15・22) + Lenalidomide(Day1-21) 4週毎  
 18コース目以降 :Isatuximab(Day1) + Dexamethasone(Day1・8・15・22) + Lenalidomide(Day1-21) 4週毎

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

| Rp | 商品名                                     | 用量[基準量]                                 | 投与方法                               | Day0 | 1                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|------------------------------------|------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | コロナール錠200mg<br>ポララミン錠2mg<br>ファモチジン錠20mg | 3錠<br>1錠<br>1錠                          | po /<br>サークリサ投与15分前                |      | ●                             |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   |                                    |      | ● Day 15<br>18コース目以降はDay1のみ投与 |   |   |   |   |   |   |
| 2  | レナデックス錠                                 | _____mg<br>[20mg/回 (適宜増減)]              | po /<br>※サークリサの実施日は<br>サークリサ投与15分前 |      | ●                             |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   |                                    |      | ● Day 8 / 15 / 22             |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 生食注(50mL)                               | 1瓶                                      | div / 0.5hr<br>前投薬直後より30分          |      | ●                             |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   |                                    |      | ● Day 15<br>18コース目以降はDay1のみ投与 |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 生食注(250mL)<br>サークリサ点滴静注                 | ※<br>_____mg[10mg/kg]<br>(※全量250mLとする。) | div /<br>投与速度は<br>換算表に準じる          |      | ○                             |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   |                                    |      | ○ Day 15<br>18コース目以降はDay1のみ投与 |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 生食注(50mL)                               | 1瓶                                      | div / フラッシュ                        |      | ●                             |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   |                                    |      | ● Day 15<br>18コース目以降はDay1のみ投与 |   |   |   |   |   |   |
| 6  | レナリドミドCap                               | 25mg[25mg/body]※1                       | po                                 |      |                               |   |   |   |   |   |   |
|    |   |   |                                    |      | ● Day 1 - 21                  |   |   |   |   |   |   |

・ サークリサ注はポリエーテルスルホン、ポリスルホン又はナイロン製のインラインフィルター(孔径:0.2又は0.22 $\mu$ m)を用いて投与すること。

※1 レナリドミドCapはクレアチニンクリアランス30-59mL/min未満の場合、10mgへ減量する。