

05N079_(維持療法)_scAmivantamab+PEM_3週毎

Amivantamab(Day1) + Pemetrexed(Day1) 3週毎

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。(外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	シアノコバラミン注1000 μ g	1 A	im								
						●					
2	調剤用バンビタン末	1 g	po / 分1								
						●					
3	デカドロン錠4mg	2 錠	po								
									●		
4	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5	生食注 ペトレキセド点滴静注液	※1 _____mg[500mg/m ²] (※1 全量100mLとする。)	div / 10min		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7	アセリオ静注液1000mg ポララミン注5mg	1 袋 1 A	div / 15min リプロファズ投与30分前		●						
8	リプロファズ配合皮下注	2400 mg [2400mg/body] ※1 体重80kg以上の場合 3360mg/body	sc / 5min		○						

- ・ NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day -1~3)
- ・ 大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。
- ・ 皮膚障害対策として、あらかじめ”RASH対応セット”をオーダーしてください。