

23N043_(脱感作)_卵巣_TC + Bev

CBDCA(Day1) + PTX(Day1) + Bevacizumab(Day1) 3週毎 6コース

◆ ____月 ____日(Day1)から ____コース実施。(外来で実施・入院で実施)

◆アルコールに対する過敏症はありませんか? → (有・無)

◆Grade3以上のカルボプラチン過敏症はありませんか? → (有・無)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(100mL) デカドロン注射液1.65mg ポララミン注5mg ファモチジン注射液20mg	1 瓶 10 A 1 A 1 A	div / 15min		●						
2	グラニセトロン点滴3mgバッグ アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 瓶	div / 30min		●						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4	テルモ生食(500mL) パクリタキセル注	1 袋 _____mg[175mg/m ²]	div / 3hr		○						
5	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6	生食注(100mL) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____mg[15mg/kg]	div / ※ 1.5hr		○						
7	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
8	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg ※Rp11の1/1000量	div / 1hr		○						
9	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg ※Rp11の1/100量	div / 1hr		○						
10	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg ※Rp11の1/10量	div / 1hr		○						
11	ブドウ糖注5%(250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg[AUC5-6]	div / 1hr		○						
12	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※ ベバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。