

06N021_大腸_Bev+XELIRI_3週毎

Bevacizumab (Day1) +CPT-11(Day1) +Capecitabine (Day1 タ - Day15 朝) 3週毎

◆ _____月 _____日(Day1)から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp	商品名	用量[基準量]	投与方法	Day0	1	2	3	4	5	6	7
1	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
2	生食注(100mL) ベバシズマブBS点滴静注	1 瓶 _____mg[7.5mg/kg]	div /※ 1.5hr		○						
3	生食注(50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
4	グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●						
5	テルモ生食(500mL) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____mg[200mg/m2]	div / 1.5hr		○						
6	生食注(50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7	カペシタビン錠	_____mg/回 [800mg/m2/回] (1日 _____mg)	po								

● Day1 タ - Day15 朝 まで
※添付文書の用法・用量のE法に準ずる。

※ ベバシズマブ注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。
・ 皮膚障害対策として、あらかじめ”手足症候群対応セット”をオーダーしてください。