

## 10N066\_胃\_Durva+FLOT\_4週毎

Durvalumab(Day1) + DTX(Day1・15) + l-LV(Day1・15) + FU(Day1・15) + L-OHP(Day1・15) 4週毎

◆ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日(Day1)から \_\_\_\_\_コース実施。( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ 免疫チェックポイント阻害薬導入時は「投与前スクリーニングセット検査」が必要です。

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

| Rp | 商品名                                                       | 用量[基準量]                                       | 投与方法                     | Day0 | 1 | 2             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|---|---------------|---|---|---|---|---|
| 1  | デカドロン錠4mg                                                 | 2 錠                                           | po                       |      |   | ●             | ● | ● |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ● Day 16 - 18 |   |   |   |   |   |
| 2  | 生食注(50mL)                                                 | 1 瓶                                           | div / 15min              |      | ● |               |   |   |   |   |   |
| 3  | 生食注(250mL)<br>イミフィンジ点滴静注                                  | 1 袋<br>_____mg[※ 1500mg/body]                 | div / 1hr                |      | ○ |               |   |   |   |   |   |
| 4  | 生食注(50mL)                                                 | 1 瓶                                           | div / 15min              |      | ● |               |   |   |   |   |   |
| 5  | パロセトロン注バッグ0.75mg/50mL<br>アロカリス点滴静注235mg<br>デカドロン注射液1.65mg | 1 袋<br>1 瓶<br>6 A                             | div / 30min              |      | ● |               |   |   |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ● Day 15      |   |   |   |   |   |
| 6  | 生食注(50mL)                                                 | 1 瓶                                           | div / フラッシュ              |      | ● |               |   |   |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ● Day 15      |   |   |   |   |   |
| 7  | 生食注(250mL)<br>ドセタキセル点滴静注                                  | 1 袋<br>_____mg[50mg/m <sup>2</sup> ]          | div / 1hr                |      | ○ |               |   |   |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ○ Day 15      |   |   |   |   |   |
| 8  | 生食注(50mL)                                                 | 1 瓶                                           | div / フラッシュ              |      | ● |               |   |   |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ● Day 15      |   |   |   |   |   |
| 9  | ブドウ糖注5%(250mL)<br>オキサリプラチン点滴静注液                           | 1 袋<br>_____mg[85mg/m <sup>2</sup> ]          | div(メイン)/ 2hr<br>l-LVと同時 |      | ○ |               |   |   |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ○ Day 15      |   |   |   |   |   |
| 10 | ブドウ糖注5%(250mL)<br>レボホリナート注                                | 1 袋<br>_____mg<br>[l-LV100mg/m <sup>2</sup> ] | div(側管)/ 2hr<br>L-OHPと同時 |      | ● |               |   |   |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ● Day 15      |   |   |   |   |   |
| 11 | テルモ生食(500mL)<br>フルオロウラシル注                                 | 1 袋<br>_____mg[2600mg/m <sup>2</sup> ]        | div(メイン)/ 24hr           |      | ○ |               |   |   |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ○ Day 15      |   |   |   |   |   |
| 12 | 生食注(50mL)                                                 | 1 瓶                                           | div / フラッシュ              |      |   | ●             |   |   |   |   |   |
|    |                                                           |                                               |                          |      |   | ● Day 16      |   |   |   |   |   |

※ イミフィンジ注は体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする。

- ・ イミフィンジ注の投与にあたっては、インラインフィルターを使用すること。
- ・ イミフィンジ注の希釈後の濃度は、1～15mg/mLとなること。