

リツキサン

+ 大津赤十字病院 薬剤部

【治療スケジュール】

				← 1クール →	
				第1日目	2～7日
薬剤名	外観	液色	薬効	投与方法	点滴
① カロナール錠	○		注射部位反応の発熱を抑えます。	↓ 内服	お休み
② ポラミン注		無色	お薬の過敏症を抑えます。	↓ 30分・点滴	
③ リツキサン注 [®] (リツキシマブ)		無色	治療に用いるお薬です。	↓ 2～3時間・点滴	
④ 生食注		無色	お薬を洗い流します。	↓ 全開・点滴	

※お薬の投与速度・投与間隔が変わることがあります。


※また、症状に応じてお薬を変更・追加・削除することがあります。

【注意事項】

点滴中は安静にし、注射の針を刺している部分が動かないように心掛けてください。お薬が皮膚に漏れると、針を刺している部分に違和感や痛み、腫れ、赤み等が現れることがあります。このような症状がありましたら速やかにお知らせください。
また、このような症状は点滴終了後や、しばらくたってから起こることがありますのでご注意ください。

【副作用と発現時期】

ここにはあくまで一般的に予想される副作用が、いつごろ現れるかをお示ししています。
これらの症状が必ず起こるということではありません。発現頻度・程度・時期には個人差があります。
また、これら以外の副作用が現れることもありますので、症状が現れた時はお知らせください。



【注意が必要な副作用】

次に示すような副作用が報告されています。下記の症状が現れた時は医師または薬剤師へお知らせください。

- | | |
|-------|---|
| 骨髄抑制 | : ★38℃以上の発熱、咳、下痢、排尿痛・残尿感、性器痛、肛門痛、
鼻血、血便・血尿、歯茎出血、腕や足の赤い斑点、疲れやすい、めまい・息切れ |
| 過敏症 | : ★呼吸困難、じん麻疹、眼および口の周囲の腫れ、冷汗、頻脈 |
| 消化器症状 | : ★突然の激しい腹痛、背部痛、重度の下痢、脱水症状、もたれ、胸やけ、吐き気、嘔吐、食欲不振 |
| 心障害 | : ★呼吸困難、足などのむくみ、咳の増加、胸痛、みぞおちや頸部の締め付け、圧迫感、冷汗 |
| 腎障害 | : ★顔・手足などのむくみ、尿量減少、尿が赤みを帯びる、体重減少、口の渇き、高度の蛋白尿 |
| 肝障害 | : ★全身倦怠感、食欲不振、疲れやすい、腹部不快感、黄疸(皮膚や眼などが黄色くなる) |
| 肺障害 | : ★胸痛、意識障害、呼吸困難、(空)咳、発汗、発熱、ピンク色の痰がでる、尿量減少、むくみ |

連絡先 大津赤十字病院

TEL 077-522-4131

平日8:30 ～ 17:00 受診されている診療科
平日17:00 ～ 翌8:30 及び 休日 救急外来