

ベバシズマブ+XELOX療法（末梢）

+ 大津赤十字病院 薬剤部

【治療スケジュール】

以下のメニューのおくすりを3週間毎繰り返します。

【治療スケジュール】				← 1クール →		
以下のメニューのおくすりを3週間毎繰り返します。				第1日目	2～14日	15～21日
薬剤名	外観	液色	薬効	投与方法	点滴	点滴
① 生食注		無色	お薬を洗い流します。	↓ 全開・点滴	お休み	お休み
② ベバシズマブ注 [®] (ベバシズマブ)		無色	細胞増殖を抑えます。	↓ 30～90分・点滴		
③ 生食注		無色	お薬を洗い流します。	↓ 全開・点滴		
④ グラニセトロンバッグ デカドロン注		無色	むかつき、吐き気及びお薬の過敏症を抑えます。	↓ 15分・点滴		
⑤ オキサリプラチン注 [®] (オキサリプラチン)		無色	細胞増殖を抑えます。	↓ 2時間・点滴		
⑥ 生食注		無色	お薬を洗い流します。	↓ 全開・点滴		
カペシタビン錠 [®] (カペシタビン)			細胞増殖を抑えます。	1日2回 14日間・内服 (第1日目夕より開始)	お休み	

※お薬の投与速度・投与間隔が変わることがあります。

※また、症状に応じてお薬を変更・追加・削除することがあります。

【注意事項】


点滴中は安静にし、注射の針を刺している部分が動かないように心掛けてください。お薬が皮膚に漏れると、針を刺している部分に違和感や痛み、腫れ、赤み等が現れることがあります。このような症状がありましたら速やかにお知らせください。
また、このような症状は点滴終了後や、しばらくたってから起こることがありますのでご注意ください。

点滴後に持続的に手や足、口の周りがしびれたり、喉が締め付けられる感覚が続くことがあります。
これらの症状は冷たいものに触れると悪化しますので、冷たい飲み物や氷の使用を避け、体を冷やさないようにしましょう。

血圧が高くなることもあるので、自宅でも家庭用血圧計を用いて、定期的に血圧をチェックしましょう。

【副作用と発現時期】

ここにはあくまで一般的に予想される副作用が、いつごろ現れるかをお示ししています。
これらの症状が必ず起こることではありません。発現頻度・程度・時期には個人差があります。
また、これら以外の副作用が現れることもありますので、症状が現れた時はお知らせください。



※骨髄は、血液成分である白血球・赤血球・血小板等を産生する臓器です。
骨髄抑制とは、その機能が低下することを言います。

【注意が必要な副作用】

次に示すような副作用が報告されています。下記の症状が現れた時は医師または薬剤師へお知らせください。

- 骨髄抑制 : ★38℃以上の発熱、咳、下痢、排尿痛・残尿感、性器痛、肛門痛、鼻血、血便・血尿、歯茎出血、腕や足の赤い斑点、疲れやすい、めまい・息切れ
- 過敏症 : ★呼吸困難、じん麻疹、眼および口の周囲の腫れ、冷汗、頻脈
- 消化器症状 : ★突然の激しい腹痛、背部痛、重度の下痢、脱水症状、もたれ、胸やけ、吐き気、嘔吐、食欲不振
- 心障害 : ★呼吸困難、足などのむくみ、咳の増加、胸痛、みぞおちや頸部の締め付け、圧迫感、冷汗
- 腎障害 : ★顔・手足などのむくみ、尿量減少、尿が赤みを帯びる、体重減少、口の渇き、高度の蛋白尿
- 肝障害 : ★全身倦怠感、食欲不振、疲れやすい、腹部不快感、黄疸(皮膚や眼などが黄色くなる)
- 脳障害 : ★突然の激しい頭痛、意識障害、歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ、うまく話せない、けいれん発作、精神状態変化、視覚異常
- 肺障害 : ★胸痛、意識障害、呼吸困難、(空)咳、発汗、発熱、ピンク色の痰がでる、尿量減少、むくみ
- 高血圧 : ★我慢できない頭痛、気分が悪く吐き気がする、意識がもうろうとする、けいれん
- 血栓 : ★意識を失いそうになる、身体の麻痺、ろれつがまわらない、激しいめまい、胸が痛む・締め付けられる感じ、足がむくむ・痛む、突然の息切れ
- 下痢・脱水 : ★口の渇き、手足のふるえ、過呼吸、重度の下痢、意識障害(時に昏睡)
- 末梢神経障害 : ★手、足や口唇周囲部の感覚異常又は知覚の変化、咽頭喉頭感覚異常
- 手足症候群 : ★手のひらや足の裏がぴりぴりする、指先の感覚異常、皮膚や爪の変色
- 視覚障害 : ★視力低下、視野異常、色覚異常
- 創傷治癒遅延 : ★傷口が治りにくい、傷口がひろく、傷口からの出血
- 出血 : ★口から血を吐く、血便、鼻血や歯肉、膣からの出血

連絡先 大津赤十字病院

Tel 077-522-4131

平日8:30 ～ 17:00 受診されている診療科
平日17:00 ～ 翌8:30 及び 休日 救急外来

皮膚症状に対する治療薬について

グレード1



皮膚の紅斑と知覚過敏はあるが、無痛性

グレード2



腫脹を伴った紅斑で疼痛を伴うが日常生活に問題なし

グレード2



腫脹を伴った紅斑で疼痛を伴うが歩行に問題なし

グレード3



亀裂、潰瘍等による強い痛みで歩行困難となる

ゼロダ適正使用ガイドより抜粋

★以下のお薬は、皮膚の症状を予防するためのものです。
治療のお薬が始まったら、一緒に使い始めて下さい。

分類	医薬品名	用法用量
保湿薬	ヘパリン類似物質 [®] クリーム 	1日6回 手のひら・足のうらの保湿

★以下のお薬は、皮膚の症状が出てきたら使用して下さい。

分類	医薬品名	用法用量
ステロイド薬	アンテベート [®] 軟膏 	1日2回 手のひら・足のうらに 赤み・痛みが出た時

★お薬を使用する際の注意点

- 2種類の外用薬が処方されますので、使用部位や回数を間違えないようにしましょう。
- 外用薬を重ねて塗る場合、保湿薬→ステロイド薬の順番で塗りましょう。
- 別に医師の指示がある場合は、指示に従ってお薬をご使用ください。

外用薬の塗り方（単純塗布法）

★ポイント

- 外用薬を塗る時は、必ず手を洗いましょう。
- 狭い患部に塗る時は、指の腹を使い、広い患部には手のひらを使います。
- お薬をすり込むのではなく、皮膚に刺激を与えないようにやさしく塗りましょう。

ステロイド薬

指の腹でお薬をとり、患部に薄く塗り広げるように塗ります。

保湿薬

手にとり、塗る部分に点在させます。指先ではなく、手のひらを使って、やさしく丁寧に、出来るだけ広い範囲に塗ります。

外用薬の塗布量

- 外用薬の塗布量を表す単位として[FTU]が使われています。
- 1FTUとは軟膏剤・クリーム剤は人差し指の先端から第一関節まで絞り出した量、ローション剤の場合は手のひらに1円玉大に出した量を表します。
- 1FTUで大人の手のひら2枚分に相当する面積を塗布することができます。

