

MVAC療法

+ 大津赤十字病院 薬剤部

【治療スケジュール】

以下のメニューのおくすりを4週間毎繰り返します。

				← 1クール →								
				第1日目	2日	3~14日	15日	16~21日	22日	23~28日		
薬剤名	外観	液色	薬効	投与方法	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴		
① 生食注		無色	治療前の流しです。	↓ 全開・点滴	お休み	お休み	↓	お休み	↓	お休み		
② メソトレキセート注 [®] (メソトレキサート)		無色	細胞増殖を抑えます。	↓ 1時間・点滴			↓		↓			
③ 生食注		無色	水分を補給します。	↓ 全開・点滴			↓		↓			
④ 生食注 硫酸マグネシウム補正液		無色	水分を補給します。 腎臓を保護します。	2時間・点滴	↓		お休み		お休み		お休み	お休み
⑤ 生食注		無色	水分を補給します。	2時間・点滴	↓							
⑥ パロノセトロンバッグ アロカリス注 デカドロン注		無色	むかつき、吐き気及びおくすりの過敏症を抑えます。	30分・点滴	↓							
⑦ 生食注		無色	お薬を洗い流します。	30分・点滴	↓							
⑧ エクザール注 [®] (ビンブラスチン)		無色	細胞増殖を抑えます。	30分・点滴	↓		お休み		お休み		↓	お休み
⑨ 生食注		無色	水分を補給します。	全開・点滴							↓	
⑩ ドキソルピシン注 [®] (ドキソルピシン)		赤色	細胞増殖を抑えます。	30分・点滴	↓		お休み		お休み		お休み	お休み
⑪ シスプラチン注 [®] (シスプラチン)		無色	細胞増殖を抑えます。	2時間・点滴	↓							
⑫ フロセミド注		無色	尿を出しやすくします。	30分・点滴	↓							
⑬ ソリュージェン注		無色	水分を補給します。	2時間×2・点滴	2日~4日目							


※お薬の投与速度・投与間隔が変わることがあります。また、症状に応じてお薬を変更・追加・削除することがあります。

【注意事項】

点滴中は安静にし、注射の針を刺している部分が動かないように心掛けてください。
お薬が皮膚に漏れると、針を刺している部分に違和感や痛み、腫れ、赤み等が現れることがあります。
このような症状がありましたら速やかにお知らせください。
また、このような症状は点滴終了後や、しばらくたってから起こることがありますのでご注意ください。
腎臓の機能を守る為、点滴の投与日および翌日はできるだけ水分を補給し、こまめに排尿するように心掛けてください。
ドキソルピシン注を点滴した後の初めの尿が赤くなることがありますが、お薬の性質によるものですので問題ありません。
赤みを帯びた尿が続くようでしたら、速やかにお知らせください。

【副作用と発現時期】

ここにはあくまで一般的に予想される副作用が、いつごろ現れるかをお示ししています。
これらの症状が必ず起こるということではありません。発現頻度・程度・時期には個人差があります。
また、これら以外の副作用が現れることもありますので、症状が現れた時はお知らせください。



※骨髄は、血液成分である白血球・赤血球・血小板等を産生する臓器です。
骨髄抑制とは、その機能が低下することを言います。

【注意が必要な副作用】

次に示すような副作用が報告されています。下記の症状が現れた時は医師または薬剤師へお知らせください。

- 骨髄抑制 : ★38℃以上の発熱、咳、下痢、排尿痛・残尿感、性器痛、肛門痛、鼻血、血便・血尿、歯茎出血、腕や足の赤い斑点、疲れやすい、めまい・息切れ
- 過敏症 : ★呼吸困難、じん麻疹、眼および口の周囲の腫れ、冷汗、頻脈
- 消化器症状 : ★突然の激しい腹痛、背部痛、重度の下痢、脱水症状、もたれ、胸やけ、吐き気、嘔吐、食欲不振
- 心障害 : ★呼吸困難、足などのむくみ、咳の増加、胸痛、みぞおちや頸部の締め付け、圧迫感、冷汗
- 腎障害 : ★顔・手足などのむくみ、尿量減少、尿が赤みを帯びる、体重減少、口の渇き、高度の蛋白尿
- 肝障害 : ★全身倦怠感、食欲不振、疲れやすい、腹部不快感、黄疸(皮膚や眼などが黄色くなる)
- 脳障害 : ★突然の激しい頭痛、意識障害、歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ、うまく話せない、けいれん発作、精神状態変化、視覚異常
- 肺障害 : ★胸痛、意識障害、呼吸困難、(空)咳、発汗、発熱、ピンク色の痰がでる、尿量減少、むくみ
- 抗利尿ホルモン不適合分泌不全 : ★全身倦怠感、無気力、眠気、意識障害、昏睡
- 横紋筋融解症 : ★筋肉が痛い、手足に力が入らない、尿が赤褐色になる
- 視覚障害 : ★視力低下、視野異常、色覚異常
- 聴力障害 : ★耳が聞こえにくい、耳鳴り、高音が聞こえにくい
- 末梢神経障害 : ★感覚や運動の麻痺、手足のしびれ、手足の痛み

連絡先 大津赤十字病院

TEL 077-522-4131

平日8:30 ～ 17:00 受診されている診療科
平日17:00 ～ 翌8:30 及び 休日 救急外来

2026/8改訂